

**Инструкция
по медицинскому применению препарата
Карипазим**

Регистрационный номер:

Торговое название

Карипазим

Лекарственная форма

Лиофилизат для приготовления раствора для наружного применения.

Состав на 1 флакон

Папаин - 350 ПЕ и 700 ПЕ.

Описание

Лиофилизированный порошок белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Протеолитическое средство.

Код АТХ [D03B].

Фармакологическое действие

Протеолитическое средство для наружного применения. Расщепляет некротизированные ткани, разжижает вязкие секреты, экссудат. Близок по действию к трипсину и химотрипсину.

Фармакокинетика.

При наружном применении препарат не всасывается и не оказывает системного влияния на организм.

Показания к применению

Ожоги III-а степени (для ускорения отторжения струпов и для очищения гранулирующих ран от гнойно-некротических масс).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Беременность, период лактации.

Способ применения и дозы

Наружно, в виде растворов 35 ПЕ/мл или 70 ПЕ/мл, в зависимости от толщины струпа. Содержимое флакона разводят в 10 мл 0,5 % растворе новокаина или 0,9 % растворе натрия хлорида. Раствор готовят непосредственно перед употреблением. Салфетку, смоченную препаратом, накладывают на ожоговую поверхность, закрывают влагонепроницаемой повязкой, которую меняют 1 раз в сутки или через день, удаляя



отслоившиеся некротизированные ткани. Одновременно обрабатывают не более 30 % общей поверхности тела. Курс лечения от 4 до 12 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Передозировка

Случаев передозировки не описано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными средствами не установлено.

Форма выпуска

Лиофилизат для приготовления раствора для наружного применения 350 ПЕ и 700 ПЕ.

По 350 ПЕ и 700 ПЕ во флаконах стеклянных, укупоренных пробками из резины и обжатых колпачками алюминиевыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 10 или 50 флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в коробку из картона.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

1 год 6 мес.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель/организация, принимающая претензии

ООО «Медфлорина»

РФ, 142279, Московская обл., Серпуховской р-н, пос. Оболенск, Промплощадка, кор. № 9
ВЛГ. Т/ф 8(4967)311967; (495)6997911.

И.О. директора ИДКЭЛС

А.Н. Васильев

Генеральный директор
ООО «Медфлорина»

В.И. Гурдаев

